

At page 84, in a footnote, Professor Marion says, "Les Amphipodes sont excessivement abondants dans nos graviers coralligènes; ils se rapportent pour la plupart à des formes nouvelles qui devaient être le sujet d'un mémoire spécial, mais qui n'ont été décrites jusqu'ici que d'une manière préliminaire (voy. Catta: *Note pour servir à l'histoire des Amphipodes du golfe de Marseille*, Revue des Sc. natur., t. IV, n° 2, septembre 1875).

"L'espèce la plus commune est le *Mæra truncatipes*, Spinn., à laquelle sont associées les *Mæra integrimana*, Heller, *Lysianassa Audouiniana*, Sp. B., *Lysianassa spinicornis*, Costa, *Melita palmata*, Leach, *Leucothoë articulosa*, Mont., *Ampelisca Belliana*, Bate, *Iphimedia obesa*, Rathke, *Liljeborgia pallida*, Bate, *Microdeutopus anomalus*, Rathke, *Protomedeia hirsutimana*, Sp. Bate, *Icridium Rissoanum*, Grube et Bate; et quelques Isopodes, *Sphæromma curtum*, Leach, *Anceus forficularis*, Risso, *Praniza ventricosa*, Risso, etc."

1883. MARION, A. F.

Considération sur les Faunes profondes de la Méditerranée d'après les dragues opérés au large des côtes méridionales de France. Mémoire N° 2. Annales du Musée d'histoire naturelle de Marseille.—Zoologie. Tome 1^{er}. Marseille, 1883.

From the "Sables vaseux au sud de Mairé, profondeur = 65 à 70 mètres; et vase sableuse de 75, 80 et 90 mètres, par le travers de Riou," *Lysianassa longicornis*, Lucas, is recorded (p. 16). Among the species dredged by the *Travailleur* between Marseilles and Corsica were *Leucothoë denticulata* and *Lysianassa ciliata*, and at the deepest station, "234 à 250 mètres," "*Ichnopus taurus*, *Ichnopus calceolatus*, *Ampelisca Gaymardi*."

1883. MARTENS, EDUARD VON.

Crustacea. The Zoological Record for 1882; being Volume nineteenth of the Record of Zoological Literature. London, M.DCCC.LXXXIII. pp. 1-39.

It is noted that *Iphigenia*, G. M. Thomson's name for a genus among the Corophidæ, is twice preoccupied in *Mollusca*.

1883. SCHNEIDER, J. SPARRE.

Nogle zoologiske iagttagelser fra Vardø i Øst-Finmarken. Separataftryk af Tromsø Museums Aarsberetning for 1882. Tromsø. 1883. pp. 16-34.

A list, accompanied by short notes, is given, pp. 27-30, of thirty-five Amphipods, none described as new, including two littoral forms, *Cyamus boopis* parasitic on *Megaptera boops*, and the rest from depths between five fathoms and thirty.

1883. SCHNEIDER, J. SPARRE.

Bidrag til en nøiere karakteristik af de ved Norges kyster forekommende Arter af familien Oediceridæ. Separataftryk af Tromsø Museums Aarshefter VI. Tromsø. 1883. 44 pages. 3 Pl.

The subfamily Oedicerina, Lilljeborg, 1865, Oedicerinæ, Boeck, 1870, was called by G. O. Sars, in 1882, the family Oediceridæ. This change is here accepted. Great weight is laid on the