

<i>Truncatulina ungeriana</i> (d'Orbigny).	<i>Pulvinulina oblonga</i> , var. <i>scabra</i> , Brady.
„ <i>wuellerstorfi</i> (Schwager).	„ <i>repanda</i> (Fichtel and Moll).
„ sp. (?).	„ <i>schreibersii</i> (d'Orbigny).
<i>Anomalina ariminensis</i> (d'Orbigny).	× „ <i>tumida</i> , Brady.
„ <i>grosserugosa</i> , Gümbel.	„ <i>umbonata</i> , Reuss.
„ <i>polymorpha</i> , Costa.	„ sp. (?).
<i>Carpenteria monticularis</i> , Carter.	<i>Rotalia soldanii</i> , d'Orbigny.
„ <i>proteiformis</i> , Goës.	<i>Gypsina globulus</i> (Reuss).
„ <i>utricularis</i> , Carter.	„ <i>inhærens</i> (Schultze).
„ sp. (?).	„ <i>vesicularis</i> (Parker and Jones).
<i>Rupertia stabilis</i> , Wallich.	„ sp. (?).
<i>Pulvinulina auricula</i> (Fichtel and Moll).	<i>Polytrema miniaceum</i> (Linné).
„ <i>canariensis</i> (d'Orbigny).	<i>Nonionina scapha</i> (Fichtel and Moll).
„ <i>concentrica</i> , Parker and Jones.	„ <i>umbilicatula</i> (Montagu).
„ <i>micheliniana</i> (d'Orbigny).	<i>Polystomella striatopunctata</i> (Fichtel and Moll).
„ <i>oblonga</i> (Williamson).	<i>Amphistegina lessonii</i> , d'Orbigny.

DIATOMACEÆ.—The following species of Diatoms were observed by Mr. Comber:—

<i>Amphora gigantea</i> , Grunow.	<i>Navicula consors</i> , A. Schmidt.
„ <i>proteus</i> , Gregory.	<i>Alloioneis antillarum</i> , Cleve and Grunow.
„ <i>lanceolata</i> , Cleve.	<i>Cocconeis scutellum</i> , Ehrenberg.
„ <i>cuneata</i> , Cleve.	„ <i>moorei</i> (= <i>Rhaphoneis</i> , O'Meara).
„ <i>spectabilis</i> , Gregory.	„ sp. (?).
„ <i>crassa</i> , Gregory, var. <i>punctata</i> , Grunow.	<i>Synedra gaillionii</i> , Ehrenberg.
<i>Navicula clavata</i> , Gregory.	„ <i>fulgens</i> , W. Smith.
„ <i>lyra</i> , Ehrenberg.	„ <i>robustus</i> , Ralfs.
„ <i>gregoriana</i> , Greville.	<i>Euphyllodium spathulatum</i> , Shadbolt.
„ <i>hennedyii</i> , W. Smith, and var.	<i>Nitzschia marina</i> , Grunow.
„ <i>prætexta</i> , Ehrenberg, var. <i>abundans</i> ,	„ <i>panduriformis</i> , Gregory.
A. Schmidt.	„ <i>plana</i> , W. Smith.
„ <i>bullata</i> , Norman.	„ <i>bilobata</i> , W. Smith.
„ <i>directa</i> , Ralfs.	<i>Perrya pulcherrima</i> , Kitton.
„ <i>maxima</i> , Gregory.	<i>Surirella fastuosa</i> , Ehrenberg.
„ <i>granulata</i> , Brebisson.	<i>Campylodiscus imperialis</i> , Greville.
„ <i>mediterranea</i> , Grunow.	„ <i>biangulatus</i> , Greville.
„ <i>smithii</i> , Brebisson.	„ <i>ecclesianus</i> , Greville.
„ <i>græffii</i> , A. Schmidt.	<i>Grammatophora macilentata</i> , W. Smith.
„ <i>campylodiscus</i> , Grunow.	<i>Fragilaria mutabilis</i> , Grunow.
„ <i>lacrimans</i> , A. Schmidt.	„ <i>schwartzii</i> , Grunow.
„ <i>suborbicularis</i> , Ralfs.	<i>Dimeregramma nanum</i> , Ralfs.
„ <i>excemta</i> , A. Schmidt.	<i>Glyphodesmis williamsonii</i> , Grunow.
„ <i>pristiophora</i> , Janisch.	„ sp. (?).
„ <i>multicostata</i> , Grunow.	<i>Plagiogramma inæquale</i> , Greville.
„ <i>didyma</i> , Kutzing.	„ <i>lyratum</i> , Greville.
„ <i>apis</i> , Kutzing.	„ <i>obesum</i> , Greville.
„ <i>splendida</i> , Gregory.	„ <i>pygmæum</i> , Greville.
„ <i>bombus</i> , Kutzing.	<i>Coccinodiscus atlanticus</i> , Castracane.
„ <i>pandura</i> , Brebisson.	„ <i>excentricus</i> , Ehrenberg.
„ <i>strangulata</i> , Greville.	„ <i>concavus</i> , Ehrenberg.