

- Biloculina bulloides*, d'Orbigny.
 „ *depressa*, d'Orbigny.
 „ „ var. *murrhyna*, Schwager.
 „ „ var. *serrata*, Brady.
 „ *irregularis*, d'Orbigny.
 „ *ringens* (Lamarck).
 „ *sphæra*, d'Orbigny.
 „ *tubulosa*, Costa.
Miliolina auberiana (d'Orbigny).
 „ *seminulum* (Linné).
 „ *tricarinata* (d'Orbigny).
Ophthalmidium inconstans, Brady.
Planispirina celata (Costa).
Cornuspira foliacea (Philippi).
Orbitolites tenuissima, Carpenter.
Astrorhiza angulosa, Brady (?).
 „ *arenaria*, Norman (?).
Pelosina cylindrica, Brady.
Psammosphæra fusca, Schulze.
Succamina sphærica, Sars.
Hyperammia ramosa, Brady.
Marsipella cylindrica, Brady.
Rhabdammina abyssorum, Sars.
Aschemonella catenata (Norman).
Rhizammina algæformis, Brady.
Reophax distans, Brady.
 „ *guttifera*, Brady.
 „ *scorpiurus*, Montfort.
Haplophragmium globigeriniiforme (Parker and Jones).
 „ *latidorsatum* (Bornemann).
 „ *scitulum*, Brady.
Placopsilina bulla, Brady.
Ammodiscus charoides (Jones and Parker).
 „ *tenuis*, Brady.
Trochammina trullissata, Brady.
Webbina clavata, Jones and Parker.
Verneuilina pygmæa (Egger).
Gaudryina pupoides, d'Orbigny.
Clavulina communis, d'Orbigny.
Bulimina aculeata, d'Orbigny.
 „ *marginata*, d'Orbigny.
- Bulimina subteres*, Brady.
Cassidulina crassa, d'Orbigny.
 „ *subglobosa*, Brady.
Lagena auriculata, Brady.
 „ „ var. *substriata*, Brady.
 „ *globosa* (Montagu).
 „ *lævigata* (Reuss).
 „ *lævis* (Montagu).
 „ *longispina*, Brady.
 „ *orbignyana* (Seguenza).
Nodosaria (Glandulina) lævigata, d'Orbigny.
 „ *obliqua* (Linné).
 „ *(Glandulina) rotundata*, Reuss.
Marginulina costata (Batsch).
Vaginulina legumen (Linné).
Polymorphina angusta, Egger.
 „ *lanceolata*, Reuss.
 „ *sororia*, Reuss.
 „ „ var. *cuspidata*, Brady.
Uvigerina pygmæa, d'Orbigny.
 „ sp. (?).
 × *Globigerina bulloides*, d'Orbigny.
 × „ *inflata*, d'Orbigny.
Pullenia quinqueloba, Reuss.
 „ *sphæroides* (d'Orbigny).
Sphæroidina bulloides, d'Orbigny.
Spirillina limbata, Brady.
Discorbina araucana (d'Orbigny).
Truncatulina grosserugosa (Gümbel).
 „ *lobatula*, Walker and Jacob.
 „ *tenera*, Brady.
 „ *wuellerstorfi* (Schwager).
 × *Pulvinulina crassa* (d'Orbigny).
 „ *elegans* (d'Orbigny).
 × „ *meliniana* (d'Orbigny).
 × „ *patagonica* (d'Orbigny).
 „ *pauperata*, Parker and Jones.
 „ *umbonata*, Reuss.
Rotalia soldanii, d'Orbigny.
Nonionina pompilioides (Fichtel and Moll).
 „ *umbilicatula* (Montagu).

Surface Organisms.—The following species are recorded from the surface at this Station:—

COPEPODA (Brady, Zool. pt. 23).
Calanus propinquus, n.sp.
Eucalanus attenuatus, Dana.
Heterochæta spinifrons, Claus.

Scolecithrix minor, n.g., n.sp.
Euchæta prestandrew, Philippi.
Candace truncata, Dana.
Ætidius armatus, n.g., n.sp.