

- „ *lymani*.
Aërope rostrata.
Asthenosoma gracile.
Briissopsis luzonica.
Dorocidaris (Cidaris) papillata.
Echinus acutus.
 „ *norvegicus*.
Hemaster gibbosus.
Maretia alta.
Micropyga tuberculata.
Phormosoma hoplacantha.
 „ *luculentum*.
Porocidaris elegans.
Pourtalesia luguncula.
Prionechinus sagittiger.
Salenia hastigera.
Cucumaria serrata.
Pannychia moseleyi.
Psolus antarcticus.
Trochostoma violaceum.
Cerebratulus macroren.
Eulagisca corrientis.
Hyalinæcia tubicola.
Nothria teniusetis.
Myzostoma murrayi.
 „ *willemoesii*.
 „ *wyville-thomsoni*.
Bairdia formosa.
 „ *victrix*.
Bythocypris reniformis.
Cythere dasyderma.
 „ *dictyon*.
Cytherella lata.
 „ *punctata*.
Krithe bartonensis.
 „ *producta*.
Macrocypris similis.
Scalpellum elongatum.
 „ *intermedium*.
Neasellus kerguelenensis.
Serolis bromleyana.
Acanthephya brachytelsonis.
 „ *sica*.
Benthesicymus altus.
Gennadas parvus.
Glyphocrangon regalis.
- Pasiphæa acutifrons*.
Pentacheles euthri.c.
Plesionika semilæris.
Sergestes atlanticus.
 „ *japonicus*.
Munida microphthalmia.
 „ *spinosa*.
 „ *subrugosa*.
Uroptychus australis.
Phoxichilidium patagonicum.
Cryptodon eroulinensis.
Ervilia subcancellata.
Leda messanensis.
Lima goliath.
 „ (*Limatula*) *confusa*.
Limopsis minuta.
Montacuta pura.
Pecten vitreus.
Basilissa alta.
Bembix aeola.
Cithna tenella.
Clionella lophoëssa.
Cyclostrema conicum.
Dentalium entalis.
Ianthina exigua.
Marginella (Glabella) musica.
Natica sp. (?).
Pleurotoma (Genota) engonia.
Seguenzia monocingulata.
Trochus (Margarita) clavatus.
Bugula reticulata.
Caperea darwinii.
Carbasea dissimilis.
 „ *pedunculata*.
Catenicella elegans.
Cibrilina monoceros.
Farciminaria hexagona.
Hippothoa diraricata.
Idmonea marionensis.
Membranipora galeata.
 „ *umbonata*.
Myriozoum marionense.
Schizoporella elegans.
Turritigera stellata.
Terebratula uva.
Ascidia tenera.