

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE OSTRACODA OBTAINED BY H.M.S. CHALLENGER.

	1 North Atlantic.	2 South Atlantic.	3 South Indian Ocean.	4 Austral- asia.	5 South Pacific.	6 North Pacific.	7 Eastern Asia.
CYPRIDÆ.							
<i>Paracypris polita</i> , G. O. Sars,	+			+	(?)		
<i>Phlyctenophora zealandica</i> , n. gen. and sp., . .				+			
<i>Aglaia clavata</i> , n. sp.,				+			
<i>meridionalis</i> , n. sp.,		+					
<i>obtusata</i> , n. sp.,			+				
<i>pusilla</i> , n. sp.,				+			
<i>Pontocypris attenuata</i> , G. S. Brady,				+			+
<i>faba</i> (?) (Reuss),				+		+	
<i>simplex</i> , n. sp.,		+		+			
<i>subreniformis</i> , n. sp.,		+		+			
<i>trigonella</i> , G. O. Sars,	+						
<i>Argillaeia badia</i> , n. sp.,			+	+			
<i>eburnea</i> , n. sp.,		+	+				
<i>Macrocypris canariensis</i> n. sp.,	+						
<i>decora</i> , G. S. Brady,	+		+	+			
<i>maculata</i> , G. S. Brady,		+	+	+			
<i>orientalis</i> , G. S. Brady,				+			
<i>setigera</i> , n. sp.,				+			
<i>similis</i> , n. sp.,		+				+	
<i>tenuicauda</i> , n. sp.,	+			+			
<i>tumida</i> , n. sp.,			+	+			
<i>Bythocypris compressa</i> , n. gen. and sp.,				+			
<i>elongata</i> , n. sp.,		+					+
<i>reniformis</i> , n. sp.,	+	+	+	+			
<i>Bairdia abyssicola</i> , n. sp.,						+	
<i>acanthigera</i> , G. S. Brady,	+					+	+
<i>amygdaloides</i> , G. S. Brady,					+	+	+
<i>angulata</i> , G. S. Brady,	+				+	+	+
<i>attenuata</i> , n. sp.,					+	+	+
<i>crosskeiana</i> , G. S. Brady,					+	+	+
<i>exaltata</i> , n. sp.,					+		+
<i>expansa</i> , n. sp.,						+	
<i>formosa</i> , G. S. Brady,		+	+		+		
<i>fortificata</i> , n. sp.,					+		
<i>foveolata</i> , G. S. Brady,		(?)			+	+	+
<i>fusca</i> , G. S. Brady,					+		.
<i>globulus</i> , n. sp.,					+		
<i>hirsuta</i> , n. sp.,						+	
<i>milne-edwardsi</i> , G. S. Brady,	+				+		+
<i>minima</i> , n. sp.,					+		
<i>ovata</i> (?), Bosquet,		+			+		