

“ 2. *Halobates sericeus*.

“ Esch., Ent., p. 164, n. 79, tab. 2. fig. 4.—Lap., Hémipt., p. 24, n. 4.—Burm., Handb. der Ent., t. ii. p. 209, n. 2.

“ Long. 1 lig. $\frac{1}{2}$.—Cette espèce se distingue de la précédente par son corps plus ovalaire et d’une moindre taille, par ses yeux d’un jaune pâle et le duvet qui recouvre le corps d’un gris-blanchâtre.—Cette espèce se trouve dans les mers équatoriales.”

VII.—C. J. B. AMYOT and AUDINET SERVILLE.

Histoire Naturelle des Insectes. Hémiptères, p. 411, 1843.

“ Genre 335.—Halobate. *Halobates*, Esch.

Lap.—Burm.—Blanch.

“ *Tête* triangulaire, avec un prolongement court et mousse entre les antennes.—*Yeux* gros, globuleux, saillants, débordants un peu les côtés du prothorax.—*Ocelles* nuls.—*Antennes* de quatre articles cylindriques ; le second un peu plus court que le premier ; le troisième un peu plus long que le premier et que le dernier (dans les larves, le premier est aussi long que tous les autres pris ensemble ; le second à peine plus long que le troisième) ; le quatrième un peu épaissi et à peine plus long que le second.—*Bec* très-court, gros à la base et pointu au bout (dans les larves, les deux premiers articles, qui semblent n’en former qu’un seul, sont courts, annuliformes ; le troisième le plus long, le quatrième court).—*Prothorax* en losange aux quatre côtés à peu près égaux, s’étendant postérieurement à angle aigu et couvrant entièrement le mésothorax (très-court dans les larves, avec le mésothorax très-grand, formant la majeure partie du corps, et point d’écusson).—*Élytres* un peu plus longues que l’abdomen, assez amples, offrant deux cellules basilaires allongées et trois discoïdales à la suite ; ailes un peu plus courtes que les élytres (les élytres et les ailes manquant, suivant tous les auteurs qui n’ont vu que les larves).—*Abdomen* conique, à peu près aussi long que le reste du corps (très-petit, presque non apparent en dessus dans les larves, tous les segments pouvant néanmoins être comptés sous le ventre et les organes sexuels assez développés).—*Pattes antérieures* courtes ; cuisses un peu épaissies ; jambes avant une dent à l’extrémité ; tarses de deux articles à peu près d’égale longueur, cylindriques ; crochets insérés dans une échancrure au milieu du deuxième article ; pattes intermédiaires très-longues, filiformes, insérées très-loin des pattes antérieures à cause de la grandeur du mésosternum, les postérieures très-fines, plus courtes que les intermédiaires, très-près des quelles elles sont insérées ; cuisses intermédiaires plus longues que les jambes ; les quatre derniers tarses de deux articles cylindriques, frangés, dont le premier six fois plus long que le second dans les tarses intermédiaires, tous deux presque d’égale longueur dans les tarses postérieures ; crochets ne nous paraissant pas exister ?