

longitudinali, laterali utrimque subrecta, nigrofuscis ; femoribus anticis utrimque longitudinaliter, tibiis tarsisque totis nigricantibus. Long. 5, lat. $2\frac{3}{4}$ millim.—China."

[This species is not a true *Halobates*, but is the type of a new genus.—F. B. W.]

XI.—Dr. GEORGE CARL BERENDT.

Die im Bernstein befindlichen organischen Reste. Bd. ii. p. 19, tab. ii. fig. 8, 1856.

[Dr. Berendt describes and figures an insect which he considers may perhaps be the larva of a *Halobates* or some allied genus. The figure shows rudiments of elytra and wings, besides other characters not belonging to *Halobates*. Under these circumstances, further consideration of it is not necessary.—F. B. W.]

XII.—CARL STÅL.

Kongliga Svenska Fregatten Eugenies Resa. Insekter. Hemiptera, p. 264, 1858.

“ Fam. PLOTERES.

“ 124. *Halobates lituratus*.

“ Flavo-testaceus ; antennis basin versus exceptis, fuscis ; macula intraoculari obsoleta, vitta thoracis, scutelli margine basali tenuissime, lineis quatuor basalibus (intermediis longioribus, apicem versus sublationibus), lineaque percurrente media et postice utrimque linea intus latiore, apicem versus angulata et in pectore continuata, hujus etiam linea laterali, tibiis tarsisque nigro-fuscis ; femoribus anticis intus et extus vitta fusca, apud ♂ incrassatis. ♂ ♀. Long. 5, lat. $2\frac{3}{4}$ millim.

“ *Halobates lituratus*. Stål, Öfv. af K. Vet.-Ak. Förh., 1854, p. 238.

“ Patria : China (Wampoa).

“ *H. picto* affinis, pictura aliter distributa. Caput flavo-testaceum, maculis una majore vel duabus minoribus intraocularibus fuscis. Antennæ corporis fere dimidia longitudine, fuscæ, basin versus flavo-testaceæ. Thorax flavo-testaceus, linea longitudinali media, margine antico et interdum macula utrimque prope lineam longitudinalalem nigro-fuscis. Scutellum flavo-testaceum, lineis longitudinalibus, una media percurrente, unaque antice utrimque cum macula oblonga vel vitta suboblique longitudinali brunescente cohærente, margine antico anguste lineaque utrimque posteriore oblique longitudinali, apice rotundato-angulata et in pectoris latere retrorsum currente, nigro-fuscis ; pectore etiam linea percurrente striolaque disci utrimque longitudinalibus nigro-fuscis. Pedes fusci, femoribus flavo-testaceis, anticis utrimque fusco-vittatis, apud marem incrassatis.”