

Vertical Range of Distribution

| | 0-100 | 100-300 | 300-500 | 500-700 | 700-1000 | |
|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|----------|-----|
| <i>Nelastoma parviceps</i> , | . | . . . | — | . . . | | 854 |
| <i>Nelastoma procerum</i> , | . | — | — | — | | 55 |
| <i>Synaphobranchus pinnatus</i> , | . | — | — | — | — | 56 |
| <i>Synaphobranchus bathybius</i> , | . | . . . | . . . | . . . | | 57 |
| <i>Synaphobranchus brevidorsalis</i> , | . | . . . | — | — | — | 58 |
| <i>Saccopharynx ampullaceus</i> , | . | . . . | — | . . . | | 59 |
| <i>Saccopharynx pelecanoides</i> , | . | . . . | . . . | . . . | | 60 |
| <i>Saccopharynx bairdii</i> , | . | . . . | — | — | — | 61 |
| <i>Nemichthys scolopacea</i> , | . | . . . | — | — | — | 62 |
| <i>Nemichthys infans</i> , | . | . . . | . . . | — | — | 63 |
| <i>Cyema atrum</i> , | . | . . . | . . . | . . . | | 64 |
| PLECTOGNATHI— | | | | | | |
| <i>Triacanthodes anomalus</i> , | . | — | . . . | . . . | | 65 |
| <i>Monacanthus tessellatus</i> , | . | — | . . . | . . . | | 66 |
| CYLOSTOMATA— | | | | | | |
| <i>Myxine glutinosa</i> , | — | — | — | — | | 67 |
| <i>Myxine australis</i> , | — | — | — | . . . | | 868 |