

BATHYMETRICAL TABLES.

A Roman numeral opposite the name of a species shows that it also occurs in one of the other Tables.

TABLE I.—Species found at depths down to 20 fathoms.

<i>Antedon acuticirra.</i>	<i>Antedon milberti.</i>
<i>adeonæ.</i>	<i>milleri.</i>
<i>anceps.</i>	<i>multiradiata.</i>
<i>articulata.</i>	<i>palmata.</i>
<i>bidens.</i>	<i>parvicirra.</i>
<i>bimaculata.</i>	<i>perspinosa.</i>
<i>bipartipinna.</i>	<i>petasus, II., III.</i>
<i>brevicuneata.</i>	<i>philiberti.</i>
<i>carinata, II.-V.</i>	<i>pinniformis.</i>
<i>carpenteri.</i>	<i>protecta.</i>
<i>clemens.</i>	<i>pumila.</i>
<i>conjungens.</i>	<i>quinduplicava.</i>
<i>disciformis.</i>	<i>regalis.</i>
<i>dübeni.</i>	<i>reginæ.</i>
<i>elegans, II.</i>	<i>reynaudi.</i>
<i>elongata.</i>	<i>rosacea, II., III.</i>
<i>eschrichti, II.-VII.</i>	<i>savignyi.</i>
<i>flagellata.</i>	<i>serripinna.</i>
<i>gyges.</i>	<i>spicata.</i>
<i>imparipinna.</i>	<i>tessellata.</i>
<i>impinnata.</i>	<i>variipinna, II.</i>
<i>indica.</i>	<i>Actinometra alternans.</i>
<i>informis.</i>	<i>belli.</i>
<i>lævicirra.</i>	<i>bennetti.</i>
<i>lævipinna.</i>	<i>borneensis.</i>
<i>lævissima.</i>	<i>brachiolata.</i>
<i>lovéni.</i>	<i>briareus.</i>
<i>ludovici.</i>	<i>coppingeri.</i>
<i>macronema, II.</i>	<i>cumingi.</i>
<i>marginata.</i>	<i>distincta.</i>
<i>microdiscus.</i>	<i>divaricata.</i>