

## II. From 20 to 50 fathoms.

|   |   |
|---|---|
| <i>Dromia ciliata</i> , n. sp.                                | <i>Spiropagurus spiriger</i> (De Haan), I.    |
| <i>Cryptodromia lateralis</i> (Gray), I., IV.                 | <i>Catapagurus australis</i> , n. sp., I.     |
| <i>Latreillia australiensis</i> , n. sp., IV.                 | <i>Pachycheles pulchellus</i> (Haswell), I.   |
| <i>Lyreidus tridentatus</i> , De Haan, V.                     | <i>Galathea australiensis</i> , Stimpson.     |
| <i>Pagurus</i> sp.  | <i>Munida subrugosa</i> (White), I., IV., VI. |
| <i>Clibanarius strigimanus</i> , White.                       |   |
| <i>Eupagurus lacertosus</i> , n. sp., var. <i>nana</i> , nov. | „ „ (White), var. <i>australiensis</i> , nov. |

## III. From 50 to 100 fathoms.

|  |   |
|--|---|
| <i>Homola orientalis</i> , n. sp., IV.                               | <i>Spiropagurus elegans</i> , Miers.      |
| <i>Latreillopsis bispinosa</i> , n. sp.                              | <i>Anapagurus pusillus</i> , n. sp., I.   |
| <i>Latreillia valida</i> , De Haan.                                  | <i>Galathea grandirostris</i> , Stimpson. |
| <i>Pagurus calidus</i> , Risso, I.                                   | „ <i>dispersa</i> , Spence-Bate.          |
| <i>Eupagurus pubescens</i> (Kröyer), var. <i>kroyeri</i> , Stimpson. | „ sp.                                     |
| <i>Eupagurus</i> (?) sp.   | <i>Munida sancti-pauli</i> , Henderson.   |

## DEEP-WATER SPECIES.

## IV. From 100 to 200 fathoms.

|   |   |
|---|---|
| <i>Cryptodromia lateralis</i> (Gray), I., II.       | <i>Parapagurus dimorphus</i> (Studer), V.     |
| „ <i>incisa</i> , n. sp.                            | <i>Pagurodes piliferus</i> , n. sp.           |
| <i>Dromidia bicornis</i> , Studer.                  | <i>Paguropsis typicus</i> , n. sp.            |
| <i>Eudromia frontalis</i> , n. sp.                  | <i>Pylocheles spinosus</i> , n. sp.           |
| <i>Homola orientalis</i> , n. sp., III.             | <i>Galathea subsquamata</i> , Stimpson.       |
| <i>Latreillia australiensis</i> , n. sp., II.       | „ <i>pusilla</i> , Henderson.                 |
| <i>Notopoides latus</i> , n. sp.                    | <i>Munida subrugosa</i> (White), I., II., VI. |
| <i>Notopus ovalis</i> , n. sp.                      | „ <i>squamosa</i> , Henderson.                |
| <i>Pagurus striatus</i> , Latreille, I.             | „ <i>scabra</i> , Henderson.                  |
| <i>Clibanarius</i> (?) sp.                          | „ <i>proxima</i> , Henderson.                 |
| <i>Eupagurus tristanensis</i> , n. sp.              | „ <i>militaris</i> , Henderson, V.            |
| „ <i>comptus</i> (White), var. <i>jugosa</i> , nov. | „ <i>haswelli</i> , Henderson.                |
| „ <i>spinulentus</i> , n. sp.                       | „ <i>inornata</i> , Henderson.                |
| <i>Paguristes subpilosus</i> , n. sp.               | <i>Elasmonotus levigatus</i> , Henderson.     |
| <i>Glaucothoë carinata</i> , n. sp.                 | <i>Eumunida smithii</i> , Henderson.          |
|   | <i>Ptychogaster levigatus</i> , Henderson.    |